

犬の寄生虫予防薬一覧

表の背景色について: 注射薬 経口投与 皮膚滴下 その他

コリー系統犬種注意記載:「※」要添付文書確認

| 製品名(ブランド名)/ 対象寄生虫                                                                                  | 犬糸状虫 | 回虫 | 鉤虫 | 犬鞭虫 | 瓜実糸虫 | 多包糸虫 | マダニ | ノミ成虫 | ノミ幼虫 | ノミ卵 | ミミゼンダニ | イヌキビダニ | イヌセンコウヒゼンダニ(疥癬虫) | シラミ | ハジミ | 蚊 | コリー系統犬種注意記載 | 成分                      | 対象動物の使用制限等<br>(主に投与月齢に関する記載)<br>詳細については添付文書をご確認ください         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|-----|------|------|-----|------|------|-----|--------|--------|------------------|-----|-----|---|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 注射用プロハート12<br>(ゾエティスジャパン)                                                                          | ○    |    |    |     |      |      |     |      |      |     |        |        |                  |     |     |   | ※           | モキシデクテン                 | 本剤は6ヵ月齢未満の犬には投与しないこと。<br>大型犬では8ヵ月齢以降に、超大型犬では10ヵ月齢以降に投与すること。 |
| アザバスカ錠<br>(日新製薬)<br>23 68 136                                                                      | ○    |    |    |     |      |      |     |      |      |     |        |        |                  |     |     |   | ※           | イベルメクチン                 | 本剤の子犬への投与は、離乳後に開始すること。                                      |
| パナメクチン錠S<br>(Meiji Seika ファルマ)<br>34 68 136 272                                                    | ○    |    |    |     |      |      |     |      |      |     |        |        |                  |     |     |   | ※           | イベルメクチン                 | 本剤の子犬への投与は、離乳後に開始すること。                                      |
| ハートメクチン錠<br>(あすかアニマルヘルス)<br>23 68 136                                                              | ○    |    |    |     |      |      |     |      |      |     |        |        |                  |     |     |   | ※           | イベルメクチン                 | 本剤の子犬への投与は、離乳後に開始すること。                                      |
| モキシハートチュアブル<br>(フジタ製薬)<br>7.5 15 30 60 136                                                         | ○    |    |    |     |      |      |     |      |      |     |        |        |                  |     |     |   | ※           | モキシデクテン                 | 本剤は離乳前の子犬には投与しないこと。                                         |
| イベルメックDSP<br>(物産アニマルヘルス)<br>34 68 136 272                                                          | ○    | ○  | ○  |     |      |      |     |      |      |     |        |        |                  |     |     |   | ※           | イベルメクチン<br>パモ酸ピランテル     | 本剤は離乳前の子犬には投与しないこと。                                         |
| イベルメックPI<br>(フジタ製薬)<br>34 68 136 272                                                               | ○    | ○  | ○  |     |      |      |     |      |      |     |        |        |                  |     |     |   | ※           | イベルメクチン<br>パモ酸ピランテル     | 本剤は離乳前の子犬には投与しないこと。                                         |
| ミルベマイシンA顆粒<br>(エランコジャパン)                                                                           | ○    | ○  | ○  | ○   |      |      |     |      |      |     |        |        |                  |     |     |   | ※           | ミルベマイシンオキシム             | (添付文書に記載なし)                                                 |
| ミルベマイシンA錠<br>(エランコジャパン)<br>1.25 2.5 5 10                                                           | ○    | ○  | ○  | ○   |      |      |     |      |      |     |        |        |                  |     |     |   | ※           | ミルベマイシンオキシム             | (添付文書に記載なし)                                                 |
| ミルベマイシンチュアブル<br>(フジタ製薬)<br>1.25 2.5 5 10                                                           | ○    | ○  | ○  | ○   |      |      |     |      |      |     |        |        |                  |     |     |   | ※           | ミルベマイシンオキシム             | 本剤は離乳前の子犬には投与しないこと。                                         |
| ミルベガード錠<br>(共立製薬)<br>1.25 2.5 5 10                                                                 | ○    | ○  | ○  | ○   |      |      |     |      |      |     |        |        |                  |     |     |   | ※           | ミルベマイシンオキシム             | (添付文書に記載なし)                                                 |
| インターセプターSチュアブル<br>(エランコジャパン)<br>S M L LL                                                           | ○    | ○  | ○  | ○   | ○    | ○    |     |      |      |     |        |        |                  |     |     |   | ※           | ミルベマイシンオキシム<br>ブラジクアンテル | 本剤は、4週齢未満の犬には投与しないこと。<br>本剤は体重1.0kg未満の犬には使用しないこと。           |
| レボリューション<br>(ゾエティスジャパン)<br>6%<br>12%<br>(0.25mL 0.5mL 1.0mL 2.0mL)                                 | ○    |    |    |     |      |      |     | ○    | ○    | ○   | ○      |        |                  |     |     |   | ※           | セラメクチン                  | 6週齢未満の犬には用いないこと。                                            |
| エビクト<br>(ビルバックジャパン)<br>6%<br>12%<br>(0.25mL 0.5mL 1.0mL 2.0mL)                                     | ○    |    |    |     |      |      |     | ○    | ○    | ○   | ○      |        |                  |     |     |   | ※           | セラメクチン                  | 6週齢未満の犬には用いないこと。                                            |
| アドボケート 犬用<br>(エランコジャパン)<br>3ピペット入り<br>(0.4mL 1.0mL 2.5mL 4.0mL)<br>クリニックパック<br>(0.4mL 1.0mL 2.5mL) | ○    | ○  | ○  |     |      |      |     | ○    |      |     |        | ○      | ○                |     |     |   | ※           | イミダクロプリド<br>モキシデクテン     | 本剤は7週齢未満の子犬へは投与しないこと。                                       |
| パノラミス錠<br>(エランコジャパン)<br>S M L LL XL                                                                | ○    | ○  | ○  | ○   |      |      | ○   | ○    |      |     |        |        |                  |     |     |   | ※           | スピノサド<br>ミルベマイシンオキシム    | 本剤は14週齢未満の子犬、又は体重2.3kg未満の犬には投与しないこと。                        |

表の背景色について:   注射薬   経口投与   皮膚滴下   その他

コリー系統犬種注意記載:「※」要添付文書確認

| 製品名(ブランド名)/ 対象寄生虫                                                           | 犬系状虫 | 回虫 | 鉤虫 | 犬鞭虫 | 瓜実条虫 | 多包条虫 | マダニ | ノミ成虫 | ノミ幼虫 | ノミ卵 | ミミズセンダニ | イヌキビダニ | イヌセンコウヒゼンダニ(疥癬虫) | シラミ | ハジミ | 蚊 | コリー系統犬種注意記載 | 成分                            | 対象動物の使用制限等<br>(主に投与月齢に関する記載)<br>詳細については添付文書をご確認ください                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|----|----|-----|------|------|-----|------|------|-----|---------|--------|------------------|-----|-----|---|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| シンパリカトリオ<br>(ゾエティスジャパン)<br>XS S M L XL XXL                                  | ○    | ○  | ○  |     |      |      | ○   | ○    |      |     |         | ○      | ○                |     |     |   | ※           | サロラネル<br>モキシデクチン<br>ピランテルパモ酸塩 | 次の動物には投与しないこと。<br>8週齢未満の犬[8週齢未満の犬に対する安全性は確立されていない]<br>体重1.5kg未満の犬[体重1.5kg未満の犬に対する安全性は確立されていない] |
| クレデリオプラス錠<br>(エランコジャパン)<br>S M L LL XL                                      | ○    | ○  | ○  | ○   |      |      | ○   | ○    |      |     |         | ○      |                  |     |     |   | ※           | ロチラネル<br>ミルベマイシンオキシム          | 本剤は8週齢未満の子犬又は1.7kg未満の犬には投与しないこと。                                                               |
| マイフリーガード 犬用<br>(物産アニマルヘルス)<br>(S M L XL)<br>クリニックパック<br>(S M L)<br>クリニックボトル |      |    |    |     |      |      |     | ○    | ○    |     |         |        |                  |     |     |   | —           | フィブロニル                        | 適応:10週齢及び体重2kg以上の犬                                                                             |
| マイフリーガードα 犬用<br>(物産アニマルヘルス)<br>(XS S M L XL)<br>クリニックパック<br>(XS S M L)      |      |    |    |     |      |      |     | ○    | ○    | ○   | ○       |        |                  | ○   | ○   |   | —           | フィブロニル<br>(S)ーメトブレン           | 適応:8週齢以上の犬                                                                                     |
| フィブロスポットドッグ<br>(共立製薬)<br>(S M L XL)<br>クリニックパック<br>(S M L)                  |      |    |    |     |      |      |     | ○    | ○    |     |         |        |                  |     |     |   | —           | フィブロニル                        | 適応:10週齢及び体重2kg以上の犬                                                                             |
| フィブロスポットプラス ドッグ<br>(共立製薬)<br>(XS S M L XL)<br>クリニックパック<br>(XS S M L)        |      |    |    |     |      |      |     | ○    | ○    | ○   | ○       |        |                  | ○   | ○   |   | —           | フィブロニル<br>Sーメトブレン             | 適応:8週齢以上の犬                                                                                     |
| ブラックティック<br>(エランコジャパン)<br>0.45mL 1.1mL 2.2mL 5.0mL                          |      |    |    |     |      |      |     | ○    | ○    |     |         |        |                  |     |     |   | —           | ピリプロール                        | 本剤は3ヵ月齢未満の子犬、体重2kg未満の小型犬、病中、回復期の犬並びに産前・産後の犬には投与しないこと。                                          |
| ブラベクトスポット犬用<br>(MSDアニマルヘルス)<br>112.5mg 250mg 500mg 1000mg                   |      |    |    |     |      |      |     | ○    | ○    |     |         |        |                  |     |     |   | —           | フルララネル                        | 本剤は8週齢未満の子犬又は体重2kg未満の犬には投与しないこと。                                                               |
| フォートレオン<br>(エランコジャパン)<br>0.4mL 0.8mL 1.6mL 3.2mL 4.0mL                      |      |    |    |     |      |      |     | ○    | ○    |     |         |        |                  |     |     | ○ | —           | イミダクロプリド<br>バルメトリン            | 本剤は6週齢以下の子犬には投与しないこと。<br>本剤は体重2kg未満の犬には使用しないこと。                                                |
| 犬用エフィプロ デュオ<br>(ビルバックジャパン)<br>0.67mL 1.34mL 2.68mL                          |      |    |    |     |      |      |     | ○    | ○    | ○   | ○       |        |                  |     |     |   | —           | フィブロニル<br>ピリプロキシフェン           | 本剤は10週齢未満又は体重2kg未満の犬には投与しないこと。                                                                 |
| ブラベクト錠<br>(MSDアニマルヘルス)<br>112.5mg 250mg 500mg 1000mg                        |      |    |    |     |      |      |     | ○    | ○    |     |         | ○      | ○                |     |     |   | —           | フルララネル                        | 本剤は8週齢未満の子犬又は体重2kg未満の犬には投与しないこと。                                                               |
| シンパリカ<br>(ゾエティスジャパン)<br>5 10 20 40 80                                       |      |    |    |     |      |      |     | ○    | ○    |     |         | ○      | ○                | ○   |     |   | —           | サロラネル                         | 次の動物には投与しないこと。<br>8週齢未満の犬[8週齢未満の犬に対する安全性は確立されていない]<br>体重1.3kg未満の犬[用量が過剰となる]                    |
| クレデリオ錠<br>(エランコジャパン)<br>S M L LL XL                                         |      |    |    |     |      |      |     | ○    | ○    |     |         | ○      |                  |     |     |   | —           | ロチラネル                         | 本剤は8週齢未満の子犬又は1.5kg未満の犬には投与しないこと。                                                               |
| ボルボプラスカラー<br>(エランコジャパン)<br>L                                                |      |    |    |     |      |      |     | ○    | ○    |     |         |        |                  |     |     |   | —           | プロボクスル<br>フルメトリン              | (添付文書に記載なし)                                                                                    |