

# 駆虫薬一覧

表の背景色について: 注射薬 経口投与 皮膚滴下 その他

コリー系統犬種注意記載:「※」要添付文書確認

| 製品名 / 対象寄生虫                                      | 対象動物 | 回虫 | 鉤虫 | 犬鞭虫 | 瓜実条虫 | 猫条虫 | 多包条虫 | メソセストイデス属条虫 | マンソン裂頭条虫 | 壺形吸虫 | コクシジウム(イソスポラ属原虫) | ジアルジア症 | コリー系統犬種注意記載 | 成分                             | 対象動物の使用制限等<br>(主に投与月齢に関する記載)<br>詳細については添付文書<br>をご確認ください                                  |
|--------------------------------------------------|------|----|----|-----|------|-----|------|-------------|----------|------|------------------|--------|-------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ミルベマックスフレーバー錠<br>(エランコジャパン)<br>小型・子猫用<br>猫用      | 猫    | ○  | ○  |     | ○    |     |      |             |          |      |                  |        | -           | ミルベマイシンオキシム<br>ブラジクアンテル        | 本剤は、6週齢未満の猫には投与しないこと。<br>本剤は体重0.5kg未満の猫には使用しないこと。                                        |
| ドロンタール錠<br>(エランコジャパン)                            | 猫    | ○  | ○  |     | ○    | ○   |      |             |          |      |                  |        | -           | ブラジクアンテル<br>パモ酸ピランテル           | 本剤は4週齢未満の猫には投与しないこと。<br>本剤は体重0.5kg未満の猫には使用しないこと。                                         |
| ドロンタールプラス錠<br>(エランコジャパン)                         | 犬    | ○  | ○  | ○   | ○    |     |      |             |          |      |                  |        | -           | ブラジクアンテル<br>パモ酸ピランテル<br>フェバンテル | 本剤は2週齢未満の犬には投与しないこと。<br>本剤は体重0.5kg未満の犬には使用しないこと。                                         |
| プロフェンダースポット<br>(エランコジャパン)<br>0.35mL 0.7mL 1.12mL | 猫    | ○  | ○  |     | ○    | ○   | ○    |             |          |      |                  |        | -           | エモデプシド<br>ブラジクアンテル             | 本剤は生後6週以下の子猫には投与しないこと。<br>本剤は体重0.5kg未満の子猫には使用しないこと。                                      |
| ドロンシット錠<br>(エランコジャパン)                            | 犬    |    |    |     | ○    |     | ○    | ○           | ○        |      |                  |        | -           | ブラジクアンテル                       | (添付文書に記載なし)                                                                              |
|                                                  | 猫    |    |    |     | ○    | ○   |      |             | ○        |      |                  |        | -           |                                |                                                                                          |
| ドロンシット注射液<br>(エランコジャパン)                          | 犬    |    |    |     | ○    |     |      | ○           | ○        |      |                  |        | -           | ブラジクアンテル                       | (添付文書に記載なし)                                                                              |
|                                                  | 猫    |    |    |     | ○    | ○   |      |             | ○        | ○    |                  |        | -           |                                |                                                                                          |
| プロコックス<br>(エランコジャパン)                             | 犬    | ○  | ○  | ○   |      |     |      |             |          |      | ○                |        | ※           | エモデプシド<br>トルトラズリル              | 本剤は2週齢未満の子犬には投与しないこと。<br>本剤は体重0.4kg未満の犬には使用しないこと。                                        |
| ピペラックスシロップ<br>(現代製薬)                             | 犬    | ○  |    |     |      |     |      |             |          |      |                  |        | -           | クエン酸ピペラジン                      | てんかん等の痙攣性疾患や心臓・肝臓・腎臓の疾患がある場合、下痢など体調が優れない場合、特異体質、妊娠中、生後3ヶ月齢未満の場合には、本剤の使用を見合わせ、獣医師に相談すること。 |
|                                                  | 猫    | ○  |    |     |      |     |      |             |          |      |                  |        | -           |                                |                                                                                          |
| エラディア<br>(ビルバックジャパン)<br>30mL 100mL               | 犬    |    |    |     |      |     |      |             |          |      |                  | ○      | -           | メトロニダゾール                       | 体重2kg未満及び1.8ヶ月齢未満の犬に対する安全性は検討されていない。                                                     |