



使用説明書

使用前に必ず本使用説明書を読み、注意事項を守って使用して下さい。

動物用医薬品

モキシデック錠7.5

(犬フィラリア症予防剤)

動物用医薬品

モキシデック錠15

(犬フィラリア症予防剤)

動物用医薬品

モキシデック錠30

(犬フィラリア症予防剤)

動物用医薬品

モキシデック錠60

(犬フィラリア症予防剤)

動物用医薬品

モキシデック錠136

(犬フィラリア症予防剤)

本剤の有効成分であるモキシデクチンは *Streptomyces cyaneogriseus* が産生するマクロライド系化合物ネマデクチンの誘導体で、抗菌性はなく、広範な抗寄生虫活性がある。

【有効成分】

モキシデック錠 7.5	1錠(50 mg重量錠剤) 中	モキシデクチン …… 7.5 µg
モキシデック錠 15	1錠(100 mg重量錠剤) 中	モキシデクチン …… 15 µg
モキシデック錠 30	1錠(200 mg重量錠剤) 中	モキシデクチン …… 30 µg
モキシデック錠 60	1錠(400 mg重量錠剤) 中	モキシデクチン …… 60 µg
モキシデック錠 136	1錠(907 mg重量錠剤) 中	モキシデクチン ……136 µg

【効能又は効果】

犬の犬糸状虫の寄生予防

【用法及び用量】

毎月1回、1か月間隔で体重1kg当たりモキシデクチンとして2～4 μ gを経口投与する。

投薬期間は、蚊の発生後1か月から蚊の発生終息1か月後までの間とする。

【使用上の注意】**【一般的注意】**

- (1) 本剤は要指示医薬品であるので獣医師等の処方せん・指示により使用すること。
- (2) 本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。
- (3) 本剤は定められた用法・用量を厳守すること。

【使用者に対する注意】

誤って薬剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。

【犬に対する注意】**1. 制限事項**

- (1) 本剤の投与前には健康状態について検査し、使用の可否を決めること。
- (2) 本剤投与前にミクロフィラリア検査及び成虫抗原検査などを実施して犬糸状虫が寄生していないことを確認して本剤を投与すること。なお、犬糸状虫が寄生していた場合には、成虫及びミクロフィラリアを駆除した後、本剤を慎重に投与すること。
- (3) 本剤は離乳前の子犬には投与しないこと。

2. 副作用

- (1) 副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。
- (2) 本剤を犬糸状虫寄生犬に投与したとき、大静脈症候群、元気消失、食欲不振などが現れることがある。
- (3) 本剤の投与により、まれに嘔吐、下痢、ふるえ、けいれんを起こすことがある。

【取扱い上の注意】

本剤は分割投与しないこと。

【保管上の注意】

- (1) 小児の手の届かないところに保管すること。
- (2) 本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。

【その他の注意】

コリー犬及びその系統の犬種において、アベルメクチン系薬剤によって、神経毒性を示したとの報告がある。

注意－獣医師等の処方せん・指示により使用すること。

【貯法】

直射日光及び高温を避け、気密容器に保存。

【包装】

モキシデック錠	7.5	60錠(12錠×5)	PTP包装
モキシデック錠	15	60錠(12錠×5)	PTP包装
モキシデック錠	30	60錠(12錠×5)	PTP包装
モキシデック錠	60	60錠(12錠×5)	PTP包装
モキシデック錠	136	60錠(6錠×10)	PTP包装

製造販売(輸入)

ゾエティス・ジャパン株式会社

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-22-7

改訂
2013.9

020354-1
Z001