



手指消毒用速乾性アルコールジェル ヒビスコールSジェル1

<第2類医薬品>

クロルヘキシジングルコン酸塩 0.2W/V% 配合
エタノール83vol%含有(溶剤として)

各種ホルダー類も
あります。
詳しくは営業担当
にお問い合わせく
ださい。



C商品特徴

1. 手肌をやさしくいたわりながらしっかり消毒

保湿成分としてアジピン酸ジイソブチル、アラントイン、グリセリンを配合し、
手荒れに配慮しています。

2. 殺菌効果が持続します

使用後も、有効成分のクロルヘキシジングルコン酸塩により、殺菌効果が持続します。

3. さらっとした使用感でべたつきません

手荒れは、医療従事者の悩みです。

手荒れに関する意識調査

アンケート対象者総数：3,730人

- ひどく手が荒れている： 322人
- 少し手が荒れている： 2,004人
- 特に手荒れはない： 1,390人
- 回答無し： 14人



サラヤ株式会社 学術部調べ


ヒビスコールSジェル1の水分保持効果

角層水分保持能

<結果>

ヒビスコールSジェル1を連続塗布すると、何も塗布していないコントロールよりも角層水分保持能が有意に($P<0.01$)増加しました。また、ヒビスコールSジェル1と当社従来品との間でも有意差($P<0.05$)が認められました。

ヒビスコールSジェル1は当社従来品と比較して高い角層水分保持能を示しており、保湿効果に優れていることが確認されました。



Drug Information 2017年10月改訂 第5版 添付文書より作成

商品名	ヒビスコールSジェル1	薬効分類番号	2619	製造販売元	サラヤ株式会社								
使用上の注意	<p>してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)</p> <ol style="list-style-type: none">1. 次の人は使用しないこと 本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人。2. 次の部位には使用しないこと (1) 損傷のある皮ふ。 (2) 目の周囲、粘膜等。 <p>相談すること</p> <ol style="list-style-type: none">1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。2. 使用後、次の症状が現れた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診察を受けること。 <table border="1"><thead><tr><th>関係部位</th><th>症 状</th><th>症状の名称</th><th>症 状</th></tr></thead><tbody><tr><td>皮 ふ</td><td>発疹・発赤、かゆみ</td><td>ショック (アナフィラキシー)</td><td>使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。</td></tr></tbody></table>	関係部位	症 状	症状の名称	症 状	皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ	ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。				
関係部位	症 状	症状の名称	症 状										
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ	ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。										
効能 又は 効果	手指の消毒												
用法 及び 用量	適量を手に取り、指先までムラなく乾くまで擦り込む。												
用法 及び 用量 に関する 注意	<ol style="list-style-type: none">(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用されること。(2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。 なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(3) 外用にのみ使用すること。(4) 血液や汚染物が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、水分を除去してから使用すること。												
成分 及び 分量	ヒビスコールSジェル1は、100mL中に有効成分としてクロルヘキシジングルコン酸塩 0.2g、溶剤としてエタノール、その他添加物としてグリセリン、アジピン酸ジイソブチル、アラントイン、ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリル、ヒプロメロースおよびプロピレングリコールを含有する。												
保管 及び 取り扱い上の 注意	<ol style="list-style-type: none">(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。(2) 小児や認知症の方の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わること)。(4) 取扱う場合、換気を十分行うこと。(5) 火気に近づけないこと。(6) 使用期限が過ぎた製品は、使用しないこと。 <ol style="list-style-type: none">(7) 本剤はアルコールを含有しているため、床などの塗装面や衣服などについたりすると変色する場合があるので注意すること。(8) ノズルの先が詰まる場合には、詰まりを取り除いてから使用すること。(9) 初期消火の場合、大量の水又は消火器で消火すること。												
包 装	60mL, 250mL, 500mL												

本製品は一般用医薬品(第2類医薬品)です。 ●ご使用の際は、ラベルに記載の説明文書をよくお読みください。