

Web セミナーのご案内

COVID-19 の今、
猫コロナウイルス感染症を確実に！

猫コロナウイルス感染症 FIP発症の予防は可能か否か？



北里大学
獣医伝染病学研究室
高野 友美 教授

講師

本セミナーでは、北里大学 獣医伝染病学研究室にて猫伝染性腹膜炎(猫コロナウイルス感染症)に関する研究をされている高野友美教授に、ご講演いただきます。

猫コロナウイルス感染症である、猫伝染性腹膜炎(FIP)ウイルスと猫腸コロナウイルスの区別の可否、さらにFIPの診断法とFIPに対抗する治療の現状について、最新の情報をお話しいたします。

臨床の現場で働く獣医療スタッフにとって、有意義な講演となっております。
是非ご視聴ください。

協賛(五十音順)：

AlphaVets 株式会社 / 共立製薬株式会社 / DS ファーマアニマルヘルス株式会社

公開

1月26日(水)13時より視聴可能！

対象者

獣医師・動物看護師

視聴方法

動画のご視聴は、下記 URL もしくは QR コードより
アクセスして頂き、パスワードをご入力の上、ご視聴ください。



URL : <https://bit.ly/3GKDXjy>

ログインパスワード : 2022



お問い合わせ先 : AlphaVets株式会社


<http://alphavets.co.jp>

TEL : 03-5701-7051



ネココロナウイルスと猫伝染性腹膜炎(FIP)

ネココロナウイルスの抗体を持つ猫



FIPの発症には、
ネココロナウイルスの感染がある

ネココロナウイルス抗体が陽性の猫の約10%が様々なストレスなどで、致死性のFIPを発症する事があります。その多くは純血種と言われています。

FIPの発症時期は、1歳未満で約70%ですが、高齢でも発症する事があります。

ネココロナウイルスの抗体を持たない猫

FIPを発症しない

ネココロナウイルス (FCoV) の感染がなければ、FIPは発症しません。

FIPの発症には **ストレス** も!

- FIPを発症したほとんどの猫は、FIPを発症する前にストレスを経験
- ウエットタイプのFIPの猫は、発症する2~4週間前のストレス
- ドライタイプのFIPの猫は、発症する1年前までのストレス

例えばこんなストレスが

- リフォーム
- 引っ越し
- 新しい家族が増える (赤ちゃん、犬、猫など)
- 狭いスペースでの多頭飼育
- 外科手術侵襲
- ト라우マ (交通事故など)
- 疾病の併発
- 妊娠・分娩・授乳

そのために

- 一度、抗体をチェックする。
- 可能な限り FCoV 抗体陽性の猫にストレスを与えない。
- 緊急以外の手術は病院と相談する。
- ペットホテルなどの使用を避け、彼らの家で誰かに世話をしてもらう。

AlphaVets株式会社

Dr.Addie の診断アルゴリズム [日本語版] は
下記 URL 又は QR コードからダウンロードできます。

URL:
<https://bit.ly/3GJFoFt>



試験研究用試薬

日本仕様にはピペット及びチップは付属していません。

ネココロナチェック (FCoV IgG抗体検出用キット)

18,480円(税込)/12検体/箱

- キット内容: コームカード、反作用プレート、ピンセット、コームスケール、使用説明書
- 必要検体: 血漿 / 血清 5 μ L または 全血 10 μ L
- 検出法: DOT-BLOT ELISA
- 検出時間: 約 40 分
- 使用期限: 製造後 15 ヶ月
- 貯蔵方法: 要冷蔵 2~8 $^{\circ}$ C
- 結果判定: 陰性 / 擬陽性 / 陽性

COVID-19の
抗体検出、診断には
使用できません。

輸入元・
お問い合わせ先

AlphaVets株式会社

東京都目黒区緑が丘 1-5-22
TEL: 03-5701-7051
e-mail: support@alphavets.co.jp
URL: alphavets.co.jp

詳しくはこちらをご覧ください

販売元

CYGNi シグニ株式会社

東京都江東区東陽 3-7-13
TEL: 0120-343155

WEB <https://vet.cygni.co.jp>